

Kategori:	Medisinsk
Tema:	MAP - Møte med aggresjonsproblematikk
Læringsmål:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ivareta egen sikkerhet i møte med aggresjon - observere og fjerne potensielt farlige gjenstander 2. Ivareta pasienten 3. Plassering; nærhet/avstand til pasienten, rømningsvei 4. Non-verbal kommunikasjon

Hendelsesforløp	<p>Mann 44, diabetes type I, ellers frisk, enslig. Innlagt grunnet hypoglykemi, irritabel og aggressiv i mottak. Behandlet med glukose i mottak, pasient fremstår som noe sløv. Pas er nylig overført til OBA, lege tar imot pasienten og skal ta vitale mål (bt,puls)</p>
------------------------	--

Nøkkelhendelser (Kritisk for gjennomføring)	<ol style="list-style-type: none"> 1: ta imot pasienten - informerer om at man ønsker å måle blodtrykk og puls 2: pasienten motsetter seg 3: lege observerer og fjerne potensielt farlige gjenstander 4: pasienten eskalerer hvis lege forsøker å ta målingene uten samtykke 5: pasienten godtar målingene dersom lege klarer å få samtykke
---	--

Beskrivelse av pasientoppførsel for markører eller operatører	<p>Noe sløv, irritabel, våkner til, ber lege å holde seg unna. Blir økende irritabel og aggressiv hvis lege forsøker å gjennomføre målinger uten samtykke, motsetter seg først målinger - samtykker etterhvert.</p> <p>Pas skal ikke bli fysisk utagerende</p>
--	--

Pasientbeskrivelse (Bakgrunnsinfo for fasilitator)	<p>Mann 44, diabetes type I, ellers frisk, enslig.</p>
--	--

Informasjon til kursdeltakerne	<p>OBA, dagvakt. Ny pasient overflyttet fra mottak. Pasienten er innlagt grunnet hypoglykemi, irritabel og aggressiv i mottak, behandlet med glukose, normalt blodsukker ved overføring fra akuttmottak.</p> <p>Du skal ta en normal inntakssamtale, og sjekke vitale mål (Bt, puls)</p>
---------------------------------------	--

SIM info	Type	
	Utstyr	Blodtrykksapparat, pulsoximeter
	Ekstra utstyr	2 senger, 2 sakser, 2 kanyler, 2 blodtrykksapparat og pulsmåler
	Medikamenter	

Utgangsverdier	Airway	
	Breathing	
	Circulation	
	Disability	
	Øvrige verdier	

Endringer i forløpet	<ol style="list-style-type: none"> 1. pasient blir økende irriterbar hvis personal forsøker å måle uten samtykke 2. pasient bli aggressiv hvis personal måler uten samtykke 3. pas viser potensielt farlig gjenstand og stirrer på personalet hvis de ikke har fjernet gjenstandene før/hvis irritasjon/aggresjon oppstår 4. pas roer seg ned dersom personalet holder avstand, og hvis de viser et ikke-truende/avslappet kroppsspråk.
-----------------------------	---

Forslag til hjelp/ notater	
-----------------------------------	--

Referanser/ Andre tips	sifer.no/map kapittel 2, 4, 5
-----------------------------------	----------------------------------